



# LES SURFACES FOURRAGÈRES

## La superficie fourragère principale

La superficie Fourragère Principale (S.F.P.) comprend les fourrages en culture principale (fourrages annuels, prairies artificielles, prairies temporaires) et la Surface Toujours en Herbe (S.T.H.) – (prairies semées depuis plus de 5 ans, prairies naturelles, parcours et landes peu productifs).

RANG : 65ème rang national (12,6% du seul premier département : l'Ille et Vilaine).




Hectares	S.A.U.	Cultures fourragères	dont maïs fourrages	S.T.H.	dont prairies perman.
1988	224 896	17 960	4 939	23 356	19 069
2000	221 848	18 725	6 223	17 153	10 232
Evolution (%)	-1	+4	+26	-27	-46

En 2000, la Surface Fourragère Principale landaise (S.F.P.) couvre 35 879 hectares pour 41 316 ha en 1988. Elle représente 16% de la S.A.U. départementale, alors que le taux national se situe à 47%.


C'est par les fourrages annuels que l'on identifie les principales régions d'élevage. Le maïs fourrage représente 33% des cultures fourragères landaises, en légère augmentation, alors que la S.T.H. a diminué de 27%.

Pour les Landes la répartition des surfaces fourragères dans leur ensemble suit celle de la S.T.H. et respecte la localisation de la SAU mais cela correspond également à la zone d'élevage et plus particulièrement à la Chalosse depuis 1988.

## Les surfaces fourragères (en ha) par canton en 2000





La Surface Toujours en Herbe




Les fourrages annuels


# LES SURFACES FOURRAGÈRES



**35 879 ha de superficie fourragère principale**  
Diminution de 13% depuis 1988




23 356 ha en 1988




17 153 ha en 2000

**La Surface Toujours en Herbe (en ha) : 27% de diminution**



Evolution de la Surface Fourragère Principale (en%)  
13% de diminution globale



Evolution des cultures fourragères (en%)  
4% d'augmentation globale

**Par canton de 1988 à 2000**

